

اکائی 1: ایک متغیر کے اعداد و شمار

اعلیٰ درجے کی مشق

نام: _____ تاریخ: _____

ہر مسئلے کے لیے اپنا کام دکھائیں اور درست جواب دیں (ایک نمبر، ایک کسر، یا ہاں/نہیں)۔ فرض کریں "معیاری انحراف" اور "تغیر" آبادی کی قدریں ہیں جب تک کہ مسئلہ "نمونہ" نہ کہے۔

1. ڈیٹا سیٹ کا حسابی اوسط تلاش کریں: 47, 52, 38, 61, 55, 43, 58, 46. 2. ڈیٹا سیٹ کا وسطانیہ تلاش کریں: 12, 19, 7, 23, 15, 31, 9, 27.

جواب: _____

جواب: _____

3. 6 نمبروں کے ڈیٹا سیٹ میں 37.5 کا حسابی اوسط ہوتا ہے۔ 4. ڈیٹا سیٹ کا بین ربعی پھیلاؤ (IQR) تلاش کریں:
 43, 58, 46. 4, 8, 15, 16, 23, 42, 5, 11, 30, 19.
 تلاش کریں۔

جواب: _____

جواب: _____

5. ڈیٹا سیٹ کا بین ربعی پھیلاؤ (IQR) تلاش کریں: 2, 4, 4, 4, 5, 5, 9, 11, 18, 27, 33, 40, 7, 14, 22, 9, 7.

جواب: _____

جواب: _____

6. ڈیٹا سیٹ کی آبادی معیاری انحراف تلاش کریں: 2, 4, 4, 4, 5, 5, 9, 11, 18, 27, 33, 40, 7, 14, 22, 9, 7.

جواب: _____

جواب: _____

7. ڈیٹا سیٹ کی آبادی تغیر تلاش کریں: 14, 18, 20, 22, 26.

جواب: _____

جواب: _____

8. 10 اقدار کے ڈیٹا سیٹ میں 35 کا حسابی اوسط ہوتا ہے۔ اگر سیٹ 9. کلاس A میں 12 طلباء ہیں جن کا اوسط ٹیسٹ اسکور 78 سے 42 قدر ہٹا دی جاتی ہے، تو باقی 7 قدروں میں سے حسابی اوسط ہے۔ کلاس B میں 18 طلباء ہیں جن کا اوسط ٹیسٹ اسکور 88 تلاش کریں۔
 15, 15, 10, 5, 5. (تقسیم کریں مربع انحراف کا مجموعہ by n - 1.)

جواب: _____

جواب: _____

10. 8 اقدار کے ڈیٹا سیٹ میں 35 کا حسابی اوسط ہوتا ہے۔ اگر سیٹ 9. کلاس A میں 12 طلباء ہیں جن کا اوسط ٹیسٹ اسکور 78 سے 42 قدر ہٹا دی جاتی ہے، تو باقی 7 قدروں میں سے حسابی اوسط ہے۔ کلاس B میں 18 طلباء ہیں جن کا اوسط ٹیسٹ اسکور 88 تلاش کریں۔
 15, 15, 10, 5, 5. (تقسیم کریں مربع انحراف کا مجموعہ by n - 1.)

جواب: _____

جواب: _____

11. ڈیٹا سیٹ میں، قدر 4 3 بار، 5 6 بار، 8 5 بار، اور 10 3 بار واقع ہوتی ہے (18 کی کل قدر). ڈیٹا سیٹ کا وسطانیہ تلاش کریں۔

جواب: _____

جواب: _____